

پاسخ به سوالات متداول بیماران در رابطه با رادیوگرافی های داخل دهانی

1- آیا از خانم های باردار می توان رادیوگرافی تهیه کرد؟

اگر تهیه رادیوگرافی فوریت ندارد بهتر است به بعد از بارداری موکول شود در غیر این صورت در موارد اورژانس لازم است وضعیت خود را به مسئول رادیولوژی اطلاع دهید تا حفاظت لازم مربوط به رادیوگرافی در دوران بارداری صورت گیرد. ترجیحا بهتر است این اقدامات در سه ماه اول بارداری و به ویژه در سه هفته اول انجام نشود. بهترین زمان برای تهیه رادیوگرافی در سه ماهه دوم و سوم بارداری می باشد.

2- آیا آمادگی خاصی برای گرفتن رادیوگرافی دندان نیاز است؟

بیماران قبل از انجام رادیوگرافی های داخل دهانی باید نکات زیر را رعایت کنند:

- عینک، ماسک، پیرسینگ در محدوده دهان، فک و صورت باید در آورده شود.
- دندان های متحرک باید از دهان خارج گردد.
- بیماران خانم در صورت باردار بودن باید به تکنسین اطلاع دهند.
- در هنگام ورود به اتاق رادیوگرافی، گوشی همراه باید خاموش گردد.

3- حفاظ تیروئید در چه مواردی استفاده میشود؟

بطوررایج حفاظ تیروئید تنها در کلیشه های داخل دهانی استفاده میشود. در کلیشه های خارج دهانی ، تصویر حفاظ اغلب ، بخش هایی از فک پایین را پوشانده و از دید خارج می نماید.

4- چه تعداد کلیشه در طول یک روز یا یک هفته و یا یک سال مجاز است؟

هیچ محدودیتی ندارد. تا زمانی که نیاز تشخیصی وجود داشته باشد باید رادیوگرافی تهیه شود. این یک اصل کلی در پزشکی میباشد. ضمن اینکه کلیشه های دندانی دارای کمترین میزان تشعشع در کل کلیشه های پزشکی میباشد.

5- سی تی اسکن دندان در چه مواردی انجام می شود؟

اگر شما قصد انجام جراحی برای ایمپلنت دارید دندانپزشک نیاز به داشتن ابعاد استخوان دارد که در رادیو گرافیهای عادی این بعلاوه در تشخیص شکستگیهای صورت، بررسی ارتباط ریشه های دندان عقل با عصب فکی ، بررسی اطلاعات موجود نیست وضعیت دندان های نهفته، بررسی وضعیت سینوس ها از نظر انحراف تیغه میانی وجود پولیپ یا التهاب مزمن سینوس، تصویربرداری سه بعدی فک و صورت یا سی بی سی تی مورد نیاز است.